| Item da RENAME | | | Respostas | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominação genérica | Concentração/Composição | Forma farmacêutica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona | 3 mg/mL + 3 mg/mL | suspensão injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| acetato de hidrocortisona | 10 mg/g (1%) | creme | | | | | | | | | | | | | | | | |
| acetato de medroxiprogesterona | 50 mg/mL | suspensão injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| acetato de medroxiprogesterona | 150 mg/mL | suspensão injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| acetato de medroxiprogesterona | 10 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| acetato de sódio | 2 mEq/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| acetazolamida | 250 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aciclovir | 200 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aciclovir | 50 mg/g (5%) | creme | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aciclovir | 250 mg | pó para solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ácido acetilsalicílico | 100 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ácido acetilsalicílico | 500 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ácido fólico | 5 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ácido fólico | 0,2 mg/mL | solução oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ácido salicílico | 50 mg/g (5%) (FN) | pomada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ácido valproico (valproato de sódio) | 250 mg | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ácido valproico (valproato de sódio) | 250 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ácido valproico (valproato de sódio) | 50 mg/mL | solução oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ácido valproico (valproato de sódio) | 50 mg/mL | xarope | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ácido valproico (valproato de sódio) | 500 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| albendazol | 40 mg/mL | suspensão oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| albendazol | 400 mg | comprimido mastigável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| alcachofra (Cynara scolymus L.) | 24 a 48 mg de derivados de ácido cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico (dose diária) | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Item da RENAME | | | Respostas | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominação genérica | Concentração/Composição | Forma farmacêutica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| alcachofra (Cynara scolymus L.) | 24 a 48 mg de derivados de ácido cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico (dose diária) | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| alcachofra (Cynara scolymus L.) | 24 a 48 mg de derivados de ácido cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico (dose diária) | solução oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| alcachofra (Cynara scolymus L.) | 24 a 48 mg de derivados de ácido cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico (dose diária) | tintura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| alcatrão mineral (FN) | 10 mg/g (1%) | pomada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| alendronato de sódio | 10 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| alendronato de sódio | 70 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| alopurinol | 100 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| alopurinol | 300 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| amoxicilina | 50 mg/mL | suspensão oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| amoxicilina | 500 mg | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| amoxicilina | 500 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| amoxicilina + clavulanato de potássio | 50 mg/mL + 12,5 mg/mL | suspensão oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| amoxicilina + clavulanato de potássio | 500 mg + 125 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| anlodipino | 5 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| anlodipino | 10 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aroeira (Schinus terebinthifolia Raddi) | 1,932 mg de ácido gálico (dose diária) | gel vaginal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aroeira (Schinus terebinthifolia Raddi) | 1,932 mg de ácido gálico (dose diária) | óvulo vaginal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| atenolol | 50 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| atenolol | 100 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| azitromicina | 500 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| azitromicina | 40 mg/mL | pó para suspensão oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| babosa (Aloe vera (L.) Burm. f.) | 10-70% gel fresco | creme | | | | | | | | | | | | | | | | |
| babosa (Aloe vera (L.) Burm. f.) | 10-70% gel fresco | gel | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Item da RENAME | | | Respostas | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominação genérica | Concentração/Composição | Forma farmacêutica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| benzilpenicilina benzatina | 600.000 unidades internacionais | pó para suspensão injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| benzilpenicilina benzatina | 600.000 unidades internacionais | suspensão injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| benzilpenicilina benzatina | 1.200.000 unidades internacionais | pó para suspensão injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| benzilpenicilina benzatina | 1.200.000 unidades internacionais | suspensão injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| benzilpenicilina potássica | 5.000.000 unidades internacionais | pó para solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina potássica | 300.000 unidades internacionais + 100.000 unidades internacionais | pó para suspensão injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| benzoilmetronidazol | 40 mg/mL | suspensão oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bicarbonato de sódio | 1 mEq/mL (8,4%) | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| brometo de ipratrópio | 0,25 mg/mL | solução para inalação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| brometo de ipratrópio | 20 microgramas/dose | solução para inalação oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| budesonida | 32 microgramas | suspensão para inalação nasal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| budesonida | 50 microgramas | suspensão para inalação nasal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| budesonida | 64 microgramas | suspensão para inalação nasal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cabergolina | 0,5 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| captopril | 25 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| carbamazepina | 200 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| carbamazepina | 400 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| carbamazepina | 20 mg/mL | suspensão oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| carbonato de cálcio | 1.250 mg (500 mg de cálcio) | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| carbonato de cálcio + colecalciferol | 1.250 mg (500 mg de cálcio) + 200 unidades internacionais | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| carbonato de cálcio + colecalciferol | 1.250 mg (500 mg de cálcio) + 400 unidades internacionais | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| carbonato de cálcio + colecalciferol | 1.500 mg (600 mg de cálcio) + 400 unidades internacionais | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Item da RENAME | | | Respostas | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominação genérica | Concentração/Composição | Forma farmacêutica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| carbonato de lítio | 300 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| carvão vegetal ativado | | pó para suspesão oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| carvedilol | 3,125 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| carvedilol | 6,25 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| carvedilol | 12,5 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| carvedilol | 25 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cáscara-sagrada (Rhamnus purshiana DC.) | 20 a 30 mg de derivados hidroxiantracênicos expressos em cascarosídeo A (dose diária) | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cáscara-sagrada (Rhamnus purshiana DC.) | 20 a 30 mg de derivados hidroxiantracênicos expressos em cascarosídeo A (dose diária) | tintura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cefalexina | 500 mg | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cefalexina | 500 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cefalexina | 50 mg/mL | suspensão oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cefotaxima sódica | 500 mg | pó para solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ceftriaxona | 250 mg | pó para solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ceftriaxona | 1 g | pó para solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ceftriaxona | 500 mg | pó para solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cetoconazol | 20 mg/g (2%) | xampu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cianocobalamina | 1.000 microgramas | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ciprofloxacino | 250 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ciprofloxacino | 500 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| claritromicina | 250 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| claritromicina | 50 mg/mL | suspensão oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| claritromicina | 500 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| claritromicina | 500 mg | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| clonazepam | 2,5 mg/mL | solução oral | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Item da RENAME | | | Respostas | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominação genérica | Concentração/Composição | Forma farmacêutica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| cloranfenicol | 250 mg | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloranfenicol | 250 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloreto de potássio | 2,56 mEq/mL (19,1%) | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloreto de sódio | 3,4 mEq/mL (20%) | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloreto de sódio | 0,9% (9 mg/mL) | solução nasal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloreto de sódio | 0,9% (0,154 mEq/mL) | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de amiodarona | 50 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de amiodarona | 200 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de amitriptilina | 25 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de amitriptilina | 75 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de biperideno | 4 mg | comprimido de liberação prolongada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de biperideno | 2 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de bupivacaína | 2,5 mg/mL (0,25%) | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de bupivacaína | 5 mg/mL (0,50%) | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de clindamicina | 150 mg | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de clindamicina | 300 mg | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de clomipramina | 10 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de clomipramina | 25 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de clorpromazina | 5 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de clorpromazina | 40 mg/mL | solução oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de clorpromazina | 25 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de clorpromazina | 100 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de dobutamina | 12,5 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de dopamina | 5 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de fluoxetina | 20 mg | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de fluoxetina | 20 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de hidralazina | 25 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de hidralazina | 50 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Item da RENAME | | | Respostas | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominação genérica | Concentração/Composição | Forma farmacêutica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| cloridrato de lidocaína | 10 mg/mL (1%) | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de lidocaína | 20 mg/mL (2%) | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de lidocaína | 20 mg/g (2%) | gel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de lidocaína | 100 mg/mL | solução spray | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de lidocaína + glicose | 50 mg/mL + 75 mg/mL (5% + 7,5%) | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de lidocaína + hemitartarato de epinefrina | 2% + 1:200.000 | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de lidocaína + hemitartarato de epinefrina | 2% + 1:80.000 | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de lidocaína + hemitartarato de epinefrina | 1% + 1:200.000 | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de metformina | 500 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de metformina | 850 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de metoclopramida | 10 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de metoclopramida | 5 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de metoclopramida | 4 mg/mL | solução oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de naloxona | 0,4 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de nortriptilina | 10 mg | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de nortriptilina | 50 mg | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de nortriptilina | 75 mg | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de nortriptilina | 25 mg | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de ondansetrona | 4 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de ondansetrona | 4 mg | comprimido orodispersível | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de ondansetrona | 8 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de ondansetrona | 8 mg | comprimido orodispersível | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de pilocarpina | 20 mg/mL (2%) | solução oftálmica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de piridoxina | 40 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Item da RENAME | | | Respostas | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominação genérica | Concentração/Composição | Forma farmacêutica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| cloridrato de prilocaína + felipressina | 30 mg/mL (3%) + 0,03 unidades internacionais/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de prometazina | 25 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de prometazina | 25 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de propafenona | 300 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de propafenona | 150 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de propranolol | 10 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de propranolol | 40 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de protamina | 10 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de ranitidina | 25 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de ranitidina | 15 mg/mL | xarope | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de ranitidina | 150 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de tetraciclina | 10 mg/g (1%) | pomada oftálmica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de tiamina | 300 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de verapamil | 80 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de verapamil | 2,5 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cloridrato de verapamil | 120 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| decanoato de haloperidol | 50 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dexametasona | 1 mg/g (0,1%) | creme | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dexametasona | 1 mg/g (0,1%) | pomada oftálmica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dexametasona | 1 mg/mL (0,1%) | suspensão oftálmica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dexametasona | 4 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dexametasona | 0,1 mg/mL | elixir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| diazepam | 5 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| diazepam | 5 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| diazepam | 10 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| digliconato de clorexidina | 0,0012 | solução bucal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| digliconato de clorexidina | 2% a 4% | solução para uso tópico | | | | | | | | | | | | | | | | |
| digoxina | 0,25 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| digoxina | 0,05 mg/mL | elixir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dinitrato de isossorbida | 5 mg | comprimido sublingual | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Item da RENAME | | | Respostas | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominação genérica | Concentração/Composição | Forma farmacêutica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| dipirona | 500 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dipirona | 500 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dipirona | 500 mg/mL | solução oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dipropionato de beclometasona | 50 microgramas/dose | solução para inalação oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dipropionato de beclometasona | 50 microgramas/dose | suspensão para inalação nasal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dipropionato de beclometasona | 200 microgramas/dose | pó para inalação oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dipropionato de beclometasona | 200 microgramas/dose | solução para inalação oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dipropionato de beclometasona | 250 microgramas/dose | solução para inalação oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dipropionato de beclometasona | 200 microgramas/dose | cápsula para inalação oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dipropionato de beclometasona | 400 microgramas/dose | pó para inalação oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dipropionato de beclometasona | 400 microgramas/dose | cápsula para inalação oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| enantato de noretisterona + valerato de estradiol | 50 mg/mL + 5 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| epinefrina | 1 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| espinheira-santa (Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek) | 60 a 90 mg taninos totais expressos em pirogalol (dose diária) | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| espinheira-santa (Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek) | 60 a 90 mg taninos totais expressos em pirogalol (dose diária) | tintura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| espinheira-santa (Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek) | 60 a 90 mg taninos totais expressos em pirogalol (dose diária) | suspensão oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| espinheira-santa (Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek) | 60 a 90 mg taninos totais expressos em pirogalol (dose diária) | emulsão oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| espironolactona | 25 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| espironolactona | 100 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| estolato de eritromicina | 25 mg/mL | suspensão oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| estolato de eritromicina | 500 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| estolato de eritromicina | 50 mg/mL | suspensão oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| estriol | 1 mg/g | creme vaginal | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Item da RENAME | | | Respostas | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominação genérica | Concentração/Composição | Forma farmacêutica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| estrogênios conjugados | 0,625 mg/g | creme vaginal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| estrogênios conjugados | 0,3 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| etinilestradiol + levonorgestrel | 0,03 mg + 0,15 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fenitoína | 100 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fenitoína | 20 mg/mL | suspensão oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fenitoína | 50 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fenobarbital | 100 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fenobarbital | 100 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fenobarbital | 40 mg/mL | solução oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| finasterida | 5 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fluconazol | 150 mg | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fluconazol | 10 mg/mL | suspensão oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fluconazol | 100 mg | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| flumazenil | 0,1 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| folinato de cálcio (ácido folínico) | 15 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fosfato de cálcio tribásico + colecalciferol | 1661,616 mg (600 mg de cálcio) + 400 unidades internacionais | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fosfato de potássio monobásico + fosfato de potássio dibásico | 0,03 g/mL + 0,1567 g/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fosfato dissódico de dexametasona | 4 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fosfato sódico de prednisolona | 1 mg/mL | solução oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fosfato sódico de prednisolona | 3 mg/mL | solução oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| furosemida | 40 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| furosemida | 10 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| garra-do-diabo (Harpagophytum procumbens DC. ex Meissn.) | 30 a 100 mg de harpagosídeo ou 45 a 150 mg de iridoides totais expressos em harpagosídeos (dose diária) | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Item da RENAME | | | Respostas | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominação genérica | Concentração/Composição | Forma farmacêutica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| garra-do-diabo (Harpagophytum procumbens DC. ex Meissn.) | 30 a 100 mg de harpagosídeo ou 45 a 150 mg de iridoides totais expressos em harpagosídeos (dose diária) | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| garra-do-diabo (Harpagophytum procumbens DC. ex Meissn.) | 30 a 100 mg de harpagosídeo ou 45 a 150 mg de iridoides totais expressos em harpagosídeos (dose diária) | comprimido de liberação retardada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| glibenclamida | 5 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| glicerol | 120 mg/mL | solução retal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| glicerol | 72 mg | supositório retal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gliclazida | 30 mg | comprimido de liberação prolongada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gliclazida | 60 mg | comprimido de liberação prolongada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gliclazida | 80 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| glicose | 50 mg/mL (5%) | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| glicose | 100 mg/mL (10%) | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| glicose | 500 mg/mL (50%) | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| guaco (Mikania glomerata Spreng.) | 0,5 a 5 mg de cumarina (dose diária) | tintura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| guaco (Mikania glomerata Spreng.) | 0,5 a 5 mg de cumarina (dose diária) | xarope | | | | | | | | | | | | | | | | |
| guaco (Mikania glomerata Spreng.) | 0,5 a 5 mg de cumarina (dose diária) | solução oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| haloperidol | 1 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| haloperidol | 5 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| haloperidol | 2 mg/mL | solução oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| haloperidol | 5 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hemitartarato de norepinefrina | 2 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| heparina sódica | 5.000 unidades internacionais/0,25 mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hidroclorotiazida | 12,5 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hidroclorotiazida | 25 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Item da RENAME | | | Respostas | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominação genérica | Concentração/Composição | Forma farmacêutica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| hidróxido de alumínio | 230 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hidróxido de alumínio | 300 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hidróxido de alumínio | 61,5 mg/mL | suspensão oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hipromelose | 3 mg/mL (0,3%) | solução oftálmica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hipromelose | 5 mg/mL (0,5%) | solução oftálmica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hortelã (Mentha x piperita L.) | 60 a 440 mg de mentol e 28 a 256 mg de mentona (dose diária) | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ibuprofeno | 200 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ibuprofeno | 300 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ibuprofeno | 600 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ibuprofeno | 50 mg/mL | suspensão oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insulina humana NPH | 100 unidades internacionais/mL | suspensão injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insulina humana regular | 100 unidades internacionais/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| isoflavona-de-soja (Glycine max (L.) Merr.) | 50 a 120 mg de isoflavonas (dose diária) | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| isoflavona-de-soja (Glycine max (L.) Merr.) | 50 a 120 mg de isoflavonas (dose diária) | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| itraconazol | 100 mg | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| itraconazol | 10 mg/mL | solução oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ivermectina | 6 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lactato de biperideno | 5 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lactulose | 667 mg/mL | xarope | | | | | | | | | | | | | | | | |
| levodopa + benserazida | 100 mg + 25 mg | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| levodopa + benserazida | 100 mg + 25 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| levodopa + benserazida | 200 mg + 50 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| levodopa + carbidopa | 200 mg + 50 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| levodopa + carbidopa | 250 mg + 25 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| levonorgestrel | 0,75 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| levonorgestrel | 1,5 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| levotiroxina sódica | 25 microgramas | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| levotiroxina sódica | 50 microgramas | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| levotiroxina sódica | 100 microgramas | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Item da RENAME | | | Respostas | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominação genérica | Concentração/Composição | Forma farmacêutica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| loratadina | 10 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| loratadina | 1 mg/mL | xarope | | | | | | | | | | | | | | | | |
| losartana potássica | 50 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maleato de dexclorfeniramina | 2 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maleato de dexclorfeniramina | 0,4 mg/mL | solução oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maleato de dexclorfeniramina | 0,4 mg/mL | xarope | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maleato de enalapril | 5 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maleato de enalapril | 10 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maleato de enalapril | 20 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maleato de timolol | 2,5 mg/mL (0,25%) | solução oftálmica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maleato de timolol | 5 mg/mL (0,5%) | solução oftálmica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medicamentos homeopáticos | Conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira 3ª edição | Conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira 3ª edição | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mesilato de doxazosina | 2 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mesilato de doxazosina | 4 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mesilato de pralidoxima | 200 mg | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| metildopa | 250 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| metronidazol | 100 mg/g (10%) | gel vaginal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| metronidazol | 250 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| metronidazol | 400 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| midazolam | 2 mg/mL | solução oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| misoprostol | 25 microgramas | comprimido vaginal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| misoprostol | 200 microgramas | comprimido vaginal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mononitrato de isossorbida | 20 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mononitrato de isossorbida | 40 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nifedipino | 10 mg | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nifedipino | 10 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nistatina | 100.000 unidades internacionais/mL | suspensão oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nitrato de miconazol | 2% (20 mg/g) | gel oral | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Item da RENAME | | | Respostas | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominação genérica | Concentração/Composição | Forma farmacêutica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| nitrato de miconazol | 2% (20 mg/g) | loção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nitrato de miconazol | 2% (20 mg/g) | pó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nitrato de miconazol | 2% (20 mg/g) | creme vaginal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nitrato de miconazol | 2% (20 mg/g) | creme | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nitrofurantoína | 100 mg | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nitrofurantoína | 5 mg/mL | suspensão oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| noretisterona | 0,35 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| óleo mineral | | óleo para uso oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| omeprazol | 10 mg | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| omeprazol | 20 mg | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| palmitato de retinol | 150.000 unidades internacionais/mL | solução oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| paracetamol | 200 mg/mL | solução oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| paracetamol | 500 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pasta d'água | FN | pasta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| permanganato de potássio | 100 mg | comprimido para uso tópico | | | | | | | | | | | | | | | | |
| permanganato de potássio | 100 mg (FN) | pó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| permetrina | 10 mg/g (1%) | loção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| permetrina | 50 mg/g (5% ) | loção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| peróxido de benzoíla | 25 mg/g (2,5%) (FN) | gel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| peróxido de benzoíla | 50 mg/g (5%) (FN) | gel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| plantago (Plantago ovata Forssk.) | 3 a 30 g (dose diária) | pó para dispersão oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| podofilina | 100 mg/mL (10%) a 250 mg/mL (25%) (FN) | solução para uso tópico | | | | | | | | | | | | | | | | |
| prednisona | 20 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| prednisona | 5 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| propiltiouracila | 100 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sais para reidratação oral | cloreto de sódio, glicose anidra, cloreto de potássio, citrato de sódio diidratado | pó para solução oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| salgueiro (Salix alba L.) | 60 a 240 mg de salicina (dose diária) | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Item da RENAME | | | Respostas | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominação genérica | Concentração/Composição | Forma farmacêutica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| salgueiro (Salix alba L.) | 60 a 240 mg de salicina (dose diária) | elixir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| salgueiro (Salix alba L.) | 60 a 240 mg de salicina (dose diária) | solução oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sinvastatina | 10 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sinvastatina | 20 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sinvastatina | 40 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| solução ringer + lactato | lactato de sódio 3 mg/mL + cloreto de sódio 6 mg/mL + cloreto de potássio 0,3 mg/mL + cloreto de cálcio 0,2 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| succinato de metoprolol | 25 mg | comprimido de liberação prolongada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| succinato de metoprolol | 50 mg | comprimido de liberação prolongada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| succinato de metoprolol | 100 mg | comprimido de liberação prolongada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| succinato sódico de hidrocortisona | 100 mg | pó para solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| succinato sódico de hidrocortisona | 500 mg | pó para solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sulfadiazina de prata | 10 mg/g (1%) | creme | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sulfametoxazol + trimetoprima | 40 mg/mL + 8 mg/mL | suspensão oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sulfametoxazol + trimetoprima | 80 mg/mL + 16 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sulfametoxazol + trimetoprima | 400 mg + 80 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sulfato de atropina | 0,25 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sulfato de gentamicina | 5 mg/g | pomada oftálmica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sulfato de gentamicina | 5 mg/mL | solução oftálmica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sulfato de magnésio | | pó para solução oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sulfato de magnésio | 10% (0,81 mEq/mL Mg++) | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sulfato de magnésio | 50% (4,05 mEq/mL Mg++) | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sulfato de salbutamol | 100 microgramas/dose | aerossol oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sulfato de salbutamol | 5 mg/mL | solução para inalação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sulfato de salbutamol | 0,5 mg/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Item da RENAME | | | Respostas | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominação genérica | Concentração/Composição | Forma farmacêutica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| sulfato de zinco | 200 microgramas/mL | solução injetável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sulfato de zinco | 10 mg | comprimido mastigável | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sulfato de zinco | 4 mg/mL | xarope | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sulfato ferroso | 5 mg/mL | xarope | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sulfato ferroso | 25 mg/mL | solução oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sulfato ferroso | 40 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tartarato de metoprolol | 100 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| teclozana | 500 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| teclozana | 10 mg/mL | suspensão oral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| unha-de-gato (Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. & Schult.)) | 0,9 mg de alcalóides oxindólicos pentaclíclicos | cápsula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| unha-de-gato (Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. & Schult.)) | 0,9 mg de alcalóides oxindólicos pentaclíclicos | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| unha-de-gato (Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. & Schult.)) | 0,9 mg de alcalóides oxindólicos pentaclíclicos | gel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| varfarina sódica | 1 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| varfarina sódica | 5 mg | comprimido | | | | | | | | | | | | | | | | |